

**PULVERIZAÇÃO EM VIDEIRAS NAS PRIMEIRAS 08 SEMANAS APÓS O INÍCIO DA BROTAÇÃO:**

Para 100 litros de caldas

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
<p><b><u>Míldio:</u></b></p> <p><u>Ridomil</u> – Máximo 4 aplicações 300 gramas</p> <p>Ou</p> <p>Censor + <u>Dithane</u> 30 ml 150 gramas</p> <p>Ou</p> <p>Amistar 24 gramas ou <u>Aliette</u> 250 gramas ou <u>Forum</u> 80 gramas ou <u>Galben</u> 250 gramas ou <u>Harpon</u> 35 gramas ou <u>Totalit</u> 100ml ou <u>Ranman</u> 30ml ou <u>Metiltiofan</u> 70 gramas</p> <p>- Fosfito uma aplicação por semana 3 aplicações antes da florada e 2 aplicações Após, com intervalo de 7 dias. 300 ml - Não aplicar junto com produto a base de Cobre.</p>			<p><u>Se Sol</u></p> <p><u>Cuprazeb</u> 350 gramas</p> <p>Ou</p> <p><u>Dithane</u> 300 gramas</p> <p>Ou</p> <p><u>Curzate</u> ou <u>Cimox</u> 250 gramas 250 gramas</p>		<p><u>Se Chuva</u></p> <p><u>Equation</u> ou <u>Daconil</u> 60 gramas 180 gramas</p>	
				<p>* Calda Bordalesa 0,5% até 1,0%</p> <p>Substitui a Calda Bordalesa * <u>Recop</u> – 250 gramas</p>		
<p>- utilizar espalhante adesivo em todas as pulverizações – Agral 30 ml. - se ocorrer ataque de besouros <u>Mustang</u> 14 ml, lagartas das folhas <u>Sparviero</u> 5ml, tripés, <u>Lebaycid</u> ou <u>Folisuper</u> 100ml, Mosca das Frutas <u>Eleitto</u> 50ml, cochonilhas <u>Provado</u> 100ml, ácaro rajado <u>Talstar</u> 50ml ou <u>Bitrin</u> 40ml, Traça dos Cachos <u>Avatar</u> 320ml. * Após a oitava semana aplicar somente os produtos a base de cobre e pós colheita <u>Score</u>, <u>Cuprazeb</u> ou <u>Dithane</u> e <u>Folicur</u>, nesta ordem com intervalo de 10 dias. Após a colheita: <u>Cabrio Top</u> 200 gramas (ferrugem).</p>						
<p>→ <b><u>Antracnose</u></b> <u>Score</u> – 08ml ou <u>Difcor</u> 100ml ou <u>Prisma Plus</u> 8ml</p> <p><b><u>Oídio</u></b> Ou</p> <p><b><u>Glomerella</u></b> <u>Cerconil PM</u> – 200 gramas</p> <p>Ou</p> <p><u>Cercobim</u> 700 – 70 gramas ou <u>Metiltiofan</u> 70 gramas</p> <p>Ou</p> <p><u>Folicur PM</u> - 100 gramas (somente iniciar as pulverizações a partir de meia grana).</p>						
<p><u>Acido Bórico</u>: 80 gramas - aumenta o tamanho da baga; - aplicar na fase de chumbinho; - aplicar sem mistura;</p>						